

# 球面調和函数変換 (SJPACK,w\_module\_sjpack)

竹広真一

平成 21 年 9 月 5 日

この文書は, ISPACK/SJPACK とそのラッパー w\_module\_sjpack を用いる上で必要となる球面調和関数変換の基本的な定式化を行う.

## 1 球面調和函数変換

東西切断波数  $M$  全波数切断  $N$  の球面調和函数逆変換は次のように表される.

$$g(\lambda, \mu) = \sum_{m=-M}^M \sum_{n=0}^N s_n^m P_n^m(\mu) \exp(im\lambda) \quad (1)$$

ここで  $\lambda$  は経度,  $\mu = \sin\varphi$  は  $\sin$  緯度である.  $P_n^m(\mu)$  はルジヤンドル陪函数であり, ISPACK では 2 に正規化されたものを用いている.

$$P_n^m(\mu) = \sqrt{(2n+1) \frac{(n-|m|)!}{(n+|m|)!}} \frac{1}{2^n n!} (1-\mu^2)^{|m|/2} \frac{d^{n+|m|}}{d\mu^{n+|m|}} (\mu^2 - 1)^n, \quad \int_{-1}^1 \{P_n^m(\mu)\}^2 d\mu = 2. \quad (2)$$

$g(\lambda, \mu)$  が実数であることから  $s_n^m$  は

$$s_n^{-m} = \{s_n^m\}^* \quad (3)$$

の関係を満たしている<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>  $\sum_{m=-n}^n s_n^m e^{im\lambda}$  を展開して  $\cos(m\lambda), \sin(m\lambda)$  の項を取りだすと

$$s_n^m e^{im\lambda} + s_n^{-m} e^{-im\lambda} = Re[s_n^m] \cos(m\lambda) + iRe[s_n^m] \sin(m\lambda) + iIm[s_n^m] \cos(m\lambda) - Im[s_n^m] \sin(m\lambda)$$

## 2 ルジャンドル陪函数

補間の際必要となるルジャンドル陪函数の性質を記しておく。2で正規化されているため通常のルジャンドル陪函数と性質が変わることに注意されたい。通常のルジャンドル陪函数を  $\tilde{P}_n^m$ , 2で正規化されたルジャンドル陪函数を  $P_n^m$  と表すと

$$\tilde{P}_n^m(\mu) = (-i)^m \sqrt{\frac{1}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!}} P_n^m(\mu) \quad (4)$$

である<sup>2</sup>。通常のルジャンドル函数の性質として、

$$\tilde{P}_m^m(\mu) = (-1)^m (2m-1)!! (1-\mu^2)^{m/2}, \quad \tilde{P}_{m+1}^m(\mu) = \mu (2m+1) \tilde{P}_m^m. \quad (5)$$

三項漸化式

$$\tilde{P}_{n+1}^m(\mu) = \frac{2n+1}{n-m+1} \mu \tilde{P}_n^m(\mu) - \frac{n+m}{n-m+1} \tilde{P}_{n-1}^m(\mu). \quad (6)$$

低次のルジャンドル陪函数

$$\tilde{P}_1^0(\mu) = \mu, \quad \tilde{P}_1^1(\mu) = -\sqrt{1-\mu^2}, \quad (7)$$

$$\tilde{P}_2^0(\mu) = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1), \quad \tilde{P}_2^1(\mu) = -3\mu\sqrt{1-\mu^2}, \quad \tilde{P}_2^2(\mu) = 3(1-\mu^2). \quad (8)$$

積分

$$\int_{-1}^1 \{\tilde{P}_n^m(\mu)\}^2 d\mu = \frac{2}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!}. \quad (9)$$

2で正規化されたルジャンドル陪函数に書き換えると、 $m, m+1$ 次のルジャンドル陪函数は<sup>3</sup>、

$$P_m^m(\mu) = \frac{\sqrt{(2m+1)!}}{2^m m!} (1-\mu^2)^{m/2}. \quad (10)$$

$$P_{m+1}^m(\mu) = \mu \sqrt{2m+3} P_m^m(\mu). \quad (11)$$

$$\begin{aligned} & + Re[s_n^{-m}] \cos(m\lambda) - i Re[s_n^{-m}] \sin(m\lambda) + i Im[s_n^{-m}] \cos(m\lambda) + Im[s_n^{-m}] \sin(m\lambda) \\ & = (Re[s_n^m] + Re[s_n^{-m}]) \cos(m\lambda) + (-Im[s_n^m] + Im[s_n^{-m}]) \sin(m\lambda) \\ & \quad + i(Im[s_n^m] + Im[s_n^{-m}]) \cos(m\lambda) + i(Re[s_n^m] - Re[s_n^{-m}]) \sin(m\lambda). \end{aligned}$$

虚数部が 0 になる条件から  $Re[s_n^m] = Re[s_n^{-m}], Im[s_n^m] = -Im[s_n^{-m}]$ , すなわち  $s_n^{-m} = \{s_n^m\}^*$  である。

<sup>2</sup>ISPACK で用いているルジャンドル陪函数は符号の定義も違っていることに注意されたい  
<sup>3</sup>

$$\begin{aligned} \tilde{P}_m^m(\mu) &= (-1)^m \sqrt{\frac{(2m)!}{2m+1}} P_m^m(\mu) = (-1)^m (2m-1)!! (1-\mu^2)^{m/2}, \\ P_m^m(\mu) &= \sqrt{\frac{2m+1}{(2m)!}} (2m-1)!! (1-\mu^2)^{m/2} = \sqrt{\frac{2m+1}{(2m)!} \frac{(2m)!}{2^m m!}} (1-\mu^2)^{m/2} \\ &= \frac{\sqrt{(2m+1)(2m)!}}{2^m m!} (1-\mu^2)^{m/2}, \end{aligned}$$

三項漸化式は<sup>4</sup>

$$P_{n+1}^m(\mu) = \sqrt{\frac{(2n+3)(2n+1)}{(n-m+1)(n+m+1)}} \mu P_n^m(\mu) - \sqrt{\frac{(2n+3)(n+m)(n-m)}{(2n-1)(n+m+1)(n-m+1)}} P_{n-1}^m(\mu). \quad (12)$$

低次のルジヤンドル陪函数は

$$P_1^0(\mu) = \sqrt{3}\mu, \quad P_1^1(\mu) = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{1-\mu^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{1-\mu^2}, \quad (13)$$

$$P_2^0(\mu) = \frac{\sqrt{5}}{2}(3\mu^2 - 1), \quad P_2^1(\mu) = \sqrt{\frac{5}{6}}3\mu\sqrt{1-\mu^2}, \quad = \sqrt{\frac{30}{2}}\mu\sqrt{1-\mu^2}, \quad (14)$$

$$P_2^2(\mu) = \sqrt{\frac{5}{24}}3(1-\mu^2) = \frac{\sqrt{120}}{24}3(1-\mu^2) = \frac{\sqrt{30}}{4}(1-\mu^2). \quad (15)$$

積分

$$\int_{-1}^1 \{P_n^m(\mu)\}^2 d\mu = 2. \quad (16)$$

---


$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{(2m+1)!}}{2^m m!} (1-\mu^2)^{m/2}. \\ \tilde{P}_{m+1}^m(\mu) &= \sqrt{\frac{(2m+1)!}{2m+3}} P_{m+1}^m(\mu) = \mu(2m+1) \tilde{P}_m^m = \mu(2m+1) \sqrt{\frac{(2m)!}{2m+1}} P_m^m(\mu), \\ P_{m+1}^m(\mu) &= \mu(2m+1) \sqrt{\frac{(2m)!}{2m+1}} \frac{2m+3}{(2m+1)!} P_m^m(\mu) = \mu(2m+1) \sqrt{\frac{2m+3}{(2m+1)^2}} P_m^m(\mu) \\ &= \mu\sqrt{2m+3} P_m^m(\mu). \end{aligned}$$

4

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{1}{2n+3} \frac{(n+m+1)!}{(n-m+1)!}} P_{n+1}^m(\mu) &= \sqrt{\frac{1}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!}} \frac{2n+1}{n-m+1} \mu P_n^m(\mu) \\ &\quad - \sqrt{\frac{1}{2n-1} \frac{(n+m-1)!}{(n-m-1)!}} \frac{n+m}{n-m+1} P_{n-1}^m(\mu), \\ P_{n+1}^m(\mu) &= \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1} \frac{(n-m+1)!}{(n+m+1)!} \frac{(n+m)!}{(n-m)!}} \frac{2n+1}{n-m+1} \mu P_n^m(\mu) \\ &\quad - \sqrt{\frac{2n+3}{2n-1} \frac{(n-m+1)!}{(n+m+1)!} \frac{(n+m-1)!}{(n-m-1)!}} \frac{n+m}{n-m+1} P_{n-1}^m(\mu), \\ &= \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1} \frac{n-m+1}{n+m+1} \frac{2n+1}{n-m+1}} \mu P_n^m(\mu) - \sqrt{\frac{2n+3}{2n-1} \frac{(n-m+1)(n-m)}{(n+m+1)(n+m)}} \frac{n+m}{n-m+1} P_{n-1}^m(\mu), \\ &= \sqrt{\frac{(2n+3)(2n+1)}{(n-m+1)(n+m+1)}} \mu P_n^m(\mu) - \sqrt{\frac{(2n+3)(n+m)(n-m)}{(2n-1)(n+m+1)(n-m+1)}} P_{n-1}^m(\mu). \end{aligned}$$

### 3 補間の計算

今、関数  $g(\lambda, \mu)$  の球面調和函数変換  $s_n^m$  が与えられたとき任意の点  $(\lambda, \mu)$  における函数の値を Clenshaw's Recurrence Formula<sup>5</sup> を用いて計算する。

---

<sup>5</sup>Clenshaw's Recurrence Formula:  
関数  $f(x)$  がとある函数系  $F_k(x)$  で

$$f(x) = \sum_0^N c_k F_k(x)$$

と表されているとする。さらに関数系が次の漸化式

$$F_{n+1}(x) = \alpha(n, x)F_n(x) + \beta(n, x)F_{n-1}(x)$$

を満たしているとする。このとき漸化式

$$y_{N+2} = y_{N+1} = 0, \quad y_k = \alpha(k, x)y_{k+1} + \beta(k+1, x)y_{k+2} + c_k$$

で定義される量  $y_k$ , ( $k = N, N-1, \dots, m$ ) を用いると  $f(x)$  を求めるための函数系の和は

$$f(x) = \beta(m+1, x)F_m(x)y_{m+2} + F_{m+1}(x)y_{m+1} + F_m(x)c_m$$

と計算することができる。

「証明」  
 $y_k$  に関する漸化式を  $c_k$  について解き,  $f(x)$  の式に代入すると

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_0^N c_k F_k(x) \\ &= y_N F_N(x) \\ &\quad + [y_{N-1} - \alpha(N-1, x)y_N]F_{N-1}(x) \\ &\quad + [y_{N-2} - \alpha(N-2, x)y_{N-1} - \beta(N-1, x)y_N]F_{N-2}(x) \\ &\quad + [y_{N-3} - \alpha(N-3, x)y_{N-2} - \beta(N-2, x)y_{N-1}]F_{N-3}(x) \\ &\quad \dots \\ &\quad + [y_{m+2} - \alpha(m+2, x)y_{m+3} - \beta(m+3, x)y_{m+4}]F_{m+2}(x) \\ &\quad + [y_{m+1} - \alpha(m+1, x)y_{m+2} - \beta(m+2, x)y_{m+3}]F_{m+1}(x) \\ &\quad + [c_m + \beta(m+1, x)y_{m+2} - \beta(m+1, x)y_{m+2}]F_m(x) \end{aligned}$$

最後の項だけ  $c_0$  のまま残し,  $\beta(1, x)y_2$  をわざと足し引きしている。各  $y_k$  について整理すると

$$\begin{aligned} f(x) &= y_N [F_N - \alpha(N-1, x)F_{N-1} - \beta(N-1, x)F_{N-2}] \\ &\quad + y_{N-1} [F_{N-1} - \alpha(N-2, x)F_{N-2} - \beta(N-2, x)F_{N-3}] \\ &\quad \dots \\ &\quad + y_{m+2} [F_{m+2} - \alpha(m+1, x)F_{m+1} - \beta(m+1, x)F_m] \\ &\quad + y_{m+1} F_{m+1} + c_m F_m + \beta(m+1, x)y_{m+2} F_m \end{aligned}$$

$F_k(x)$  の漸化式より  $k = N, N-1, \dots, 2$  まではキャンセルし、残りの項は最後の行だけになる。したがって

$$f(x) = \beta(m+1, x)y_{m+2} F_m + y_{m+1} F_{m+1} + c_m F_m$$

三角波数切断の場合  $M = N$  を考えて,

$$\begin{aligned}
 g(\lambda, \mu) &= \sum_{m=-M}^M \sum_{n=0}^M s_n^m P_n^m(\mu) \exp(im\lambda) \\
 &= \sum_{n=0}^M s_n^0 P_n^0(\mu) + \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^M (s_n^m P_n^m(\mu) \exp(im\lambda) + s_n^{-m} P_n^m(\mu) \exp(-im\lambda)) \\
 &= \sum_{n=0}^M s_n^0 P_n^0(\mu) + \sum_{m=1}^M \sum_{n=|m|}^M (Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + (Re[s_n^{-m}] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) + Im[s_n^{-m}] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + i(Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) + Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + i(Im[s_n^{-m}] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - Re[s_n^{-m}] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &= \sum_{n=0}^M s_n^0 P_n^0(\mu) + \sum_{m=1}^M \sum_{n=|m|}^M (Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + (Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + i(Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) + Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &\quad + i(-Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda)) \\
 &= \sum_{n=0}^M s_n^0 P_n^0(\mu) + \sum_{m=1}^M \sum_{n=|m|}^M (2Re[s_n^m] P_n^m(\mu) \cos(m\lambda) - 2Im[s_n^m] P_n^m(\mu) \sin(m\lambda))
 \end{aligned}$$

ただしスペクトル係数の関係式  $(s_n^- m)^* = s_n^m$  より  $Re[s_n^- m] = Re[s_n^m]$ ,  $Im[s_n^- m] = -Im[s_n^m]$  を用いた.  $n$  についての和は Clenshaw's Recurrence Formula で計算できる. 漸化式から

$$\alpha(n, m, x) = \sqrt{\frac{(2n+3)(2n+1)}{(n-m+1)(n+m+1)}} x, \quad \beta(n, m) = -\sqrt{\frac{(2n+3)(n+m)(n-m)}{(2n-1)(n+m+1)(n-m+1)}}$$

とおいて,  $f_m(\mu) = \sum_{n=m}^M a_n^m P_n^m(\mu)$  は

$$\begin{aligned}
 y_{K+2} &= y_{K+1} = 0, \\
 y_k &= \alpha(k, m, \mu)y_{k+1} + \beta(k+1, m)y_{k+2} + a_k^m, \quad (k = K, K-1, \dots, m+1) \\
 f_m(\mu) &= \beta(m+1, m)y_{m+2} P_m^m(\mu) + P_{m+1}^m(\mu)y_{m+1} + a_m^m P_m^m(\mu) \\
 &= \beta(m+1, m)y_{m+2} P_m^m(\mu) + \mu\sqrt{2m+3} P_m^m(\mu)y_{m+1} + a_m^m P_m^m(\mu) \\
 &= [a_m^m + \beta(m+1, m)y_{m+2} + \mu\sqrt{2m+3}y_{m+1}] P_m^m(\mu). \tag{19}
 \end{aligned}$$

ただし  $P_m^m(\mu) = \frac{\sqrt{(2m+1)!}}{2^m m!} (1-\mu^2)^{m/2}$  と計算することができる.  $\sum_{n=m}^M b_n^m P_n^m(\mu)$

の和も同様に計算できる.  $\sum_{n=0}^M a_n^0 P_n^0(\mu)$  の場合は  $f_0(\mu) = \sum_{n=0}^M a_n^0 P_n^0(\mu)$  は

$$y_{K+2} = y_{K+1} = 0,$$

$$\begin{aligned} y_k &= \alpha(k, 0, \mu)y_{k+1} + \beta(k+1, 0)y_{k+2} + a_k^0, \quad (k = K, K-1, \dots, 1), \quad (20) \\ f_0(\mu) &= \beta(1, 0)y_2 P_m^m(\mu) + P_1^0(\mu)y_1 + a_0^0 P_0^0(\mu) = \beta(1, 0)y_2 + \sqrt{3}\mu y_1 + a_0^0 \end{aligned}$$

## 4 エネルギー・エンストロフィースペクトルの計算

今、流線関数  $\psi(\lambda, \varphi)$  の球面調和函数展開係数  $s_n^m$  が与えられたとき全エネルギー  $E$  次のように計算される。

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \left( \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right)^2 + \frac{1}{\cos^2 \varphi} \left( \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \right)^2 \right] \cos \varphi d\varphi d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_0^{2\pi} \left[ \psi \cos \varphi \left( \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} d\lambda - \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \psi \frac{1}{\cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \psi} \left( \cos \varphi \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \cos \varphi d\varphi d\lambda \right. \\ &\quad \left. + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \frac{\psi}{\cos^2 \varphi} \left( \frac{\partial \psi}{\partial \lambda} \right) \right]_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi - \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\psi}{\cos^2 \varphi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \lambda^2} \cos \varphi d\varphi d\lambda \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ - \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \psi \frac{1}{\cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \psi} \left( \cos \varphi \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) \right] \cos \varphi d\varphi d\lambda \right. \\ &\quad \left. - \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{\cos^2 \varphi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \lambda^2} \cos \varphi d\varphi d\lambda \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ - \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \psi \left[ \frac{1}{\cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \psi} \left( \cos \varphi \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \right) + \frac{\psi}{\cos^2 \varphi} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \lambda^2} \right] \cos \varphi d\varphi d\lambda \right\} \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \psi \nabla^2 \psi \cos \varphi d\varphi d\lambda. \end{aligned} \quad (22)$$

ここで、球面調和函数展開係数を用いると

$$\psi = \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n s_n^m P_n^m(\sin \varphi) \exp(im\lambda) \quad (23)$$

であるから、

$$\begin{aligned} E &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \psi \nabla^2 \psi \cos \varphi d\varphi d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n s_n^m P_n^m(\sin \varphi) \exp(im\lambda) \right] \\ &\quad \left[ \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} n'(n'+1) s_{n'}^{m'} P_{n'}^{m'}(\sin \varphi) \exp(im'\lambda) \right] \cos \varphi d\varphi d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& n'(n'+1)s_{n'}^{m'}s_n^m P_n^m(\sin \varphi)P_{n'}^{m'}(\sin \varphi)\exp(im'\lambda)\exp(im\lambda)\cos \varphi d\varphi d\lambda \\
= & \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} \\
& n'(n'+1)s_{n'}^{m'}s_n^m P_n^m(\sin \varphi)P_{n'}^{m'}(\sin \varphi)\cos \varphi d\varphi \delta_{m,-m'} 2\pi \\
= & \pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M n'(n'+1)s_{n'}^{-m}s_n^m \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_n^m(\sin \varphi)P_{n'}^{-m}(\sin \varphi)\cos \varphi d\varphi \\
= & \pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M n'(n'+1)s_{n'}^{-m}s_n^m 2\delta_{n,n'} \\
= & 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)s_n^{-m}s_n^m \\
= & 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)(s_n^m)^*s_n^m \\
= & 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)|s_n^m|^2 \tag{24}
\end{aligned}$$

$$= 4\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)(Re[s_n^m]^2 + Im[s_n^m]^2) \tag{25}$$

$$= 4\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)|s_n^m|^2. \tag{26}$$

途中、元の関数が実数であることからでてくる  $s_n^{-m} = (s_n^m)^*$  を用いた。これより全エネルギーを  $(n, m)$  各成分にわけることができて、 $\frac{1}{2}n(n+1)|s_n^m|^2$  をエネルギースペクトルの  $(n, m)$  成分という。また  $m$  について和をとった各成分  $\frac{1}{2} \sum_{m=-n}^n n(n+1)|s_n^m|^2$  をエネルギースペクトルの  $n$  成分と呼ぶ。

同じような計算を全エンストロフィーにも行うことができる。

$$\begin{aligned}
Q &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\nabla^2 \psi)^2 \cos \varphi d\varphi d\lambda \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n(n+1)s_n^m P_n^m(\sin \varphi) \exp(im\lambda) \right] \\
&\quad \left[ \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} n'(n'+1)s_{n'}^{m'} P_{n'}^{m'}(\sin \varphi) \exp(im'\lambda) \right] \cos \varphi d\varphi d\lambda \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} \\
&\quad n(n+1)n'(n'+1)s_{n'}^{m'}s_n^m P_n^m(\sin \varphi)P_{n'}^{m'}(\sin \varphi) \exp(im'\lambda) \exp(im\lambda) \cos \varphi d\varphi d\lambda
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M \sum_{m'=-n'}^{n'} \\
&\quad n(n+1)n'(n'+1)s_n^{m'} s_n^m P_n^m(\sin \varphi) P_{n'}^{m'}(\sin \varphi) \cos \varphi d\varphi \delta_{m,-m'} 2\pi \\
&= \pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M n(n+1)n'(n'+1)s_n^{-m} s_n^m \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_n^m(\sin \varphi) P_{n'}^{-m}(\sin \varphi) \cos \varphi d\varphi \\
&= \pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n \sum_{n'=0}^M n(n+1)n'(n'+1)s_n^{-m} s_n^m 2\delta_{n,n'} \\
&= 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2 s_n^{-m} s_n^m \\
&= 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2 (s_n^m)^* s_n^m \\
&= 2\pi \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2 |s_n^m|^2 \tag{27}
\end{aligned}$$

$$= 4\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2 (Re[s_n^m]^2 + Im[s_n^m]^2) \tag{28}$$

$$= 4\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=0}^M \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2 |s_n^m|^2. \tag{29}$$

これより全エンストロフィーを  $(n, m)$  各成分にわけることができて,  $\frac{1}{2}n^2(n+1)^2|s_n^m|^2$  をエンストロフィースペクトルの  $(n, m)$  成分と呼ぶ. また,  $\frac{1}{2} \sum_{m=-n}^n n^2(n+1)^2|s_n^m|^2$  エンストロフィースペクトルの  $n$  成分と呼ぶ.